

Agroblen®



Efektyvi ir užtikrinta augalų maitinimo sistema lauko sąlygomis auginamiems augalams. Sistema apjungia ypatingą mitybinių elementų derinį su specialia biologiškai iria organinės kilmės danga, kuri leidžia kontroliuoti maistinių medžiagų tirpumą bei patekimą į augalų reguliuojamais kiekiais per nustatytą laikotarpį. Tai kur kas efektyviau nei tręšiant su įprastomis trąšomis, kur maistinių medžiagų išsiplovimas yra neišvengiamas. Su Agroblen augalo aprūpinimas mitybos elementais atitinka jo poreikį – suteikia augalui pakankamą reikalingų maisto medžiagų kiekį ir optimalų augimą.

Kodėl Agroblen – geras pasirinkimas?

- 1 Efektyvesnis gaunamų maistinių medžiagų pasisavinimas.
- 2 Didesnė augalo apsauga nuo taip vadinamo "druskų streso" ankstyvajame augimo tarpsnyje.
- 3 Didesnis ar ekvivalentiškai toks pat derlius su mažesniu nei įprastą mineralinių trąšų kiekiu, visa tai – dėl ženkliai didesnio Agroblen efektyvumo.
- 4 Geresnė derliaus kokybė dėl subalansuotos mitybos.
- 5 Paprastesnės naudoti, mažesnės išlaidos ir mažesnis dirvos suspaudimas dėl rečiau laukuose atliekamų technikos darbų.
- 6 Birios trąšos, nebijant granulių trupėjimo ar sušokimo.
- 7 Žymiai mažesnis nepageidaujamas ir nuostolingas maisto medžiagų netekimas – tai padeda augintojams tiksliau kontroliuoti maistinių medžiagų (svarbiausia azoto) naudojimo apribojimą.
- 8 Nebūtinas papildomas tręšimas su drėkinimo sistemomis, kas gali būti aktualu didelio kritulių kiekio regionuose.
- 9 Nekenksmingas aplinkai.

Agroblen asortimentas


Agroblen formulė	Veikimo laikas
18-8-16+2MgO	2-3 mėnesiai
15-25-10+3MgO	2-3 mėnesiai
13-13-13+3Mg	3-4 mėnesiai
18-5-11+4CaO+2MgO	3-4 mėnesiai
15-8-16+5MgO	5-6 mėnesiai
20-10-10+4MgO	5-6 mėnesiai
14-12-9+3CaO+0.1B	8-9 mėnesiai
11-21-9+6Mg	8-9 mėnesiai
9-13-18+3MgO+0,5Fe	12-14 mėnesių

Kaip naudoti Agroblen?

- Rekomenduojama naudoti Agroblen ne anksčiau kaip 1-2 savaitės iki augalų sodinimo.
- Agroblen trąšos paskleidžiamos ištisai arba lokaliai (tręšiant lokaliai, trąšų norma iki 25% gali būti mažesnė). Agroblen įterpiamos 3 įprastais būdais: barstant ištisai/padrikai, juostiniu būdu, tikslinis įterpimas eilutėse šalia augalo/beriant į augalo sodinimo vietą.
- Visais naudojimo būdais geriausi rezultatai pasiekiami, kai išbarsčius trąšas, žemė sudrėkinama. Tai gali būti lietus, drėkinimo sistemos purkštuvai ar lašelinė sistema, montuojama virš trąšų įterpimo linijos.
- Geriausi rezultatai pasiekiami, kai Agroblen granulės įterpiamos į dirvą 5-10 cm gyliu, nes ilgalaikis ir tiesioginis saulės spindulių poveikis gali susilpninti trąšų pasisavinimo tolygumą.



Nuskanuokite šį kodą – išvysite E-Max technologijos vaizdo įrašą.



Rekomendacijos	Norma, kg/ha	Agroblen formulė	Veikimo laikas
Lauko augalai	200-400	18-8-16+2MgO	2-3 mėnesiai
Lauko, daržo augalai	300-600 (vid. 450)	15-25-10+3MgO	2-3 mėnesiai
Daržo, sodo augalai, daigynas	300-600 (vid. 450)	13-13-13+3Mg	3-4 mėnesiai
Braškės, daržo augalai	250-400	18-5-11+4CaO+2MgO	3-4 mėnesiai
Daržo, sodo augalai, medelynas	300-600 (vid. 450)	15-8-16+5MgO	5-6 mėnesiai
Daržo, sodo augalai, medelynas	300-600 (vid. 450)	20-10-10+4MgO	5-6 mėnesiai
Ilgos vegetacijos, daugiamečiai augalai, sodai, medelynas, atsodinami miškai	300-600 40-60 g/augalui 35-45 g/augalui	14-12-9+3CaO+0.1B	8-9 mėnesiai
Ilgos vegetacijos, daugiamečiai augalai, sodai, atsodinami miškai, medelynas	400-800	11-21-9+6Mg	8-9 mėnesiai
Ilgos vegetacijos, daugiamečiai augalai, atsodinami miškai, medelynas	400-800	9-13-18+3MgO+0,5Fe	12-14 mėnesių
barstant eilutėse	400-800		
barstant ištisai	500-1000		
spygliuočiai	20-30 g/augalui		

Agroblen trąšų granulių tirpumas ir veikimas priklauso tik nuo dirvos temperatūros apsprendžiamų sąlygų. Nurodytas veikimo laikas apskaičiuotas prie +21°C temperatūros (nustatyta laboratorinėmis sąlygomis). Esant dirvos temperatūrai +11°C, trąšų tirpumas ir poveikis ilgėja vidutiniškai 3-4 mėn. ir atvirkščiai – aukštesnėje temperatūroje jų poveikis trumpėja. Minusinėje temperatūroje (žiema) trąšos neveikia, jų veikimas prasideda kito sezono metu.

Bendrosios rekomendacijos

Agroblen turėtų būti naudojamas ne anksčiau kaip 1-2 savaitės iki augalų sodinimo/sėjos. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai dirva pakankamai drėgna (drėkinama arba prieš arba po patręšimo Agroblen). Esant kritinėms situacijoms, papildomas tręšimas teigiamai veikia Jūsų produkcijos kokybinį ir kiekybinį rezultatą.

Prašome susisiekti su UAB „Vitera Baltic“ atstovais dėl Jūsų auginamų kultūrų tręšimo plano, įsivertinant Jūsų laukų esamą situaciją, sudarymo. Džiaugiamės, galėdami Jums pasiūlyti šią paslaugą nemokamai. Kontaktai: www.vitera.lt

Gamintojas:



Everris International B.V. Sertifikuotas, remiantis ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

©/TM Trade Marks of Everris International © Copyrights Everris

everris.